

05./06.10.2015 in Karlsruhe – Arbeitsforum THG-Bilanzierung in der Landwirtschaft

Organische Kohlenstoffvorräte der Böden in Baden-Württemberg

Dr. Frank Waldmann

*Gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg im Rahmen des Programms KLIMOPASS*



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG


Datengrundlagen

I Einzeldaten (LUBW, FVA, LGRB, Lit.)

Standorte:	7489
Acker:	3748
Grünland:	997
Wald:	2364
Rebland:	36
Sonstige:	344

Analysedaten

Acker	C_{org} : 5964	TRD: 1204
Grünland	C_{org} : 2206	TRD: 1072
Wald	C_{org} : 8337	TRD: 5791



II Gemeindemittelwerte - Humus (LTZ)

differenziert nach 8 Bodenarten und 3 Nutzungen (Acker, Grünland, Rebland)
für 247 Gemeinden

Zugrunde liegende Einzeldaten

Acker:	10491
Grünland:	728

Bearbeitung - Teilmengen

- **Nutzung (3)**

- Acker
- Grünland
- Wald

- **Bodentypengruppen (9)**

- Rendzina
- Pararendzina
- Braunerde, Parabraunerde, Pelosol und Terra fusca
- Podsol
- Auenboden und Kolluvium
- Gley, Auengley und Pseudogley
- Stagnogley
- Nass-, Humus- und Anmoorgley
- Moor


- **Tiefenbereich (2)**

- 0 bis 30 cm u. Fl.
- 30 bis 100 cm u. Fl.



***Bewirtschaftungseinflüsse
werden nicht berücksichtigt***

Beispiele Bewirtschaftung

Anteil Mulchsaatflächen bei Ackernutzung
(MEKA 2010 incl. Abschätzung für Problem-
und Sanierungs-WSG)




Anteil Zwischenfruchtflächen bei Ackernutzung
(MEKA 2010 incl. Abschätzung für Problem-
und Sanierungs-WSG)




Beispiele

C_{org} -Gehalte Oberboden unter Acker in Abhängigkeit von der Jahresdurchschnittstemperatur, zusammengefasst für Braunerden, Parabraunerden, Pelosole und Terra fuscen; Bodenarten: Schluff & Lehm; n = 3617




C_{org} -Gehalte Oberboden unter Wald in Abhängigkeit vom Jahresniederschlag, zusammengefasst für Braunerden, Parabraunerden, Pelosole und Terra fuscen; Bodenarten: Schluff & Lehm; n = 1649.



Beispiele

Mittlere Humusgehalte unter Acker in Abhängigkeit vom Tongehalt
Grundlage LTZ: ausgewählte Gemeindemittelwerte

$$y = 0,0713x + 1,6513 \quad R^2 = 0,84$$



Berechnung Einzelstandorte: C_{org}-Gehalte 0-30 cm u. FI für Bodentypgruppe „Braunerde, Parabraunerde, Pelosol, Terra fusca“

Multiple lineare Regression	R ²	n
Acker		
$C_{org} = 2,267 + (0,000998 * B) - (0,179 * C) + (0,0158 * D) - (0,00490 * E) - (0,266 * H)$	0,21	3802
Grünland		
$C_{org} = 3,291 - (0,128 * A) + (0,00269 * B) - (0,304 * C) + (0,0351 * D)$	0,25	383
Wald (ohne Auflagehumus)		
$C_{org} = 3,920 - (0,189 * A) + (0,00270 * B) - (0,263 * C) + (0,0304 * D) - (0,0229 * H)$	0,43	2746

Prädiktoren:

- A Tiefe unter Flur (cm) [nur bei Grünland und Wald]
- B Mittlerer Jahresniederschlag (mm)
- C Mittlere Jahrestemperatur (°C)
- D Ton (%)
- E Sand (%)
- F Hangneigung (%)
- G Exposition (Grad) [Werte >180: 180-(Wert-180)]
- H Reliefposition [TCI_{low}] (dimensionslos)

Berechnung Gemeindemittelwerte: Humus-Gehalte Oberboden


Bodentypen	Multiple lineare Regression	R ²	n
Acker			
„alle“	Mittlerer Humusgehalt = $6,663 - (0,551 * \text{Jahresmitteltemperatur}) + (0,0581 * \text{Ton})$	0,43	*
vorherrschend: Braunerde, Parabraunerde, Pelosol, Terra fusca	Mittlerer Humusgehalt = $3,909 - (0,376 * \text{Jahresmitteltemperatur}) + (0,0963 * \text{Ton})$	0,53	**
Grünland			
„alle“	Mittlerer Humusgehalt = $-11,904 + (0,0107 * \text{Jahresniederschlag}) + (0,820 * \text{Jahresmitteltemperatur}) + (0,0558 * \text{Ton})$	0,58	***

* 111 Datensätze, verteilt auf 66 Gemeinden mit zusammen 9898 Einzelproben

** 52 Datensätze, verteilt auf 15 Gemeinden mit zusammen 2285 Einzelproben

*** 19 Datensätze, verteilt auf 8 Gemeinden mit zusammen 477 Einzelproben



Corg-Gehalte Oberböden [50 m Raster]





Corg-Gehalte der Oberböden
(Gew.-%)



C_{org}-Vorräte der Böden (kg/m²)



keine Angabe



keine Angabe

Mittlere C_{org} -Vorräte der Böden Baden-Württembergs in t/ha

Nutzung	Hinweis	Tiefe (cm u. FI)			Anteil am Gesamtvorrat
		0 - 30	0 - 70	0 - 100	
Acker		66	89	98	65 %
Grünland (incl. Ödland)	ohne Moor- und Anmoorstandorte	81	106	115	70 %
	incl. Moor- und Anmoorstandorte	92	125	137	
Wald		75	94	101	75 %

Mittlere C_{org} -Vorräte der Böden Baden-Württembergs in t/ha - Plausibilisierung -

Nutzung	Hinweis	Tiefe (cm u. Fl)		
		0 - 30	0 - 70	0 - 100
Acker		66	89	98
Grünland (incl. Ödland)	ohne Moor- und Anmoorstandorte	81	106	115
	incl. Moor- und Anmoorstandorte	92	125	137
Wald		75	94	101
Weitere Daten aus Süddeutschland				
Acker	Bayern ¹⁾			90
	Rheinland-Pfalz ²⁾			115
Grünland	Bayern ¹⁾			118
	Rheinland-Pfalz ²⁾			128
Wald	Bayern ¹⁾			98
	Rheinland-Pfalz ²⁾			101

¹⁾ Bayerisches Landesamt für Umwelt (2014)

²⁾ Sauer et. al. (2015) [Berechnung bis max. 200 cm u. Fl.]

Abschätzung der C_{org} -Vorräte der Böden Baden-Württembergs zwischen 0-30 cm u. Fl. in t/ha bei zunehmender Temperaturerhöhung

Nutzung	Temperaturveränderung ^{1), 2)}			
	status quo	+1 °C	+2 °C	+3 °C
Acker	66	61 [5]	58 [8]	56 [10]
Grünland	92	85 [7]	78 [14]	74 [18]
Wald	75	71 [4]	68 [7]	66 [9]

1) Die Temperaturen wurden nur bis zu einer mittleren Jahrestemperatur von maximal 10,5 °C erhöht. Die den Berechnungen zugrunde liegenden Regressionen sind nur bis hierher gültig. Eine weitere lineare C_{org} -Abnahme bei höheren Temperaturen ist nicht wahrscheinlich. So nehmen z. B. in den trocken-warmen Schwarzerdegebieten in Sachsen C_{org} -Gehalte und -Vorräte wieder zu (Kolbe 2009).

2) Bei Mooren, Anmoor-, Nass- und Stagnogleyen werden keine C_{org} -Vorratsänderungen bei veränderteren Temperaturen berechnet.

Vergleich

*In Bayern ergeben die modellierten C_{org} -Vorratsänderungen bis zum Jahr 2100 bei konstantem C-Input für das Klimaszenario A1B (REMO_UBA) unter Acker und Grünland einen Rückgang von **12 – 16 t/ha** und unter Wald von **20 – 22 t/ha** (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014, S. 81f).*

Abschätzung der C_{org}-Vorräte der Böden Baden-Württembergs zwischen 0-30 cm u. FI. in Mio. t bei zunehmender Temperaturerhöhung

Nutzung	Fläche (ha)	Temperaturveränderung ^{1), 2)}			
		status quo	+1°C	+2°C	+3°C
Acker	970.000	64	59	56	54
Grünland (incl. Ödland)	650.000	60	55	51	48
Wald	1.370.000	103	97	93	90
<i>Summe</i>	2.990.000	227	211	200	192

^{1), 2)} Restriktionen siehe vorherige Folie

Abschätzung der C_{org}-Vorräte der Böden Baden-Württembergs zwischen 0-30 cm u. Fl. in Mio. t bei zunehmender Temperaturerhöhung

Nutzung	Fläche (ha)	Temperaturveränderung ^{1), 2)}			
		status quo	+1°C	+2°C	+3°C
Acker	970.000	64	59	56	54
Grünland (incl. Ödland)	650.000	60	55	51	48
Wald	1.370.000	103	97	93	90
<i>Summe</i>	2.990.000	227	211	200	192
Veränderung gegenüber status quo					
C _{org} -Vorrat (Mio. t)			-16	-27	-35
CO ₂ -Emission (Mio. t)			59	99	128
CO ₂ -Emission pro Jahr (Mio. t/a) – bezogen auf einen Zeitraum von 50 Jahren			1,17	1,98	2,57
Zusätzliche CO ₂ -Emission pro Jahr aus Moor- und Anmoorstandorten (Mio. t/a) ³⁾		0,63	k. A.	k. A.	k. A.

1), 2) siehe vorherige Folie

3) Weinzierl und Waldmann 2014 [Moor und Anmoor: ca. 1,3 % der Landesfläche]

Weitere Informationen

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg (Hrsg.)
(2015): Organische Kohlenstoffvorräte der Böden in Baden-Württemberg.-
LGRB-Fachbericht, Band 2015/1.

Download

https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=1991



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

Dr. Frank Waldmann
Regierungspräsidium Freiburg
Ref. 93
Albertstr. 5
79104 Freiburg i. Br.
E-Mail: frank.waldmann@rpf.bwl.de
Tel.: 0761-208-3157